

Empfehlung für die Routineentwurmung bei Mastbetrieben

Rein-Raus-Verfahren

- Einmalige Entwurmung über 10 Tage nach Einstellen in die Mast (z.B. mit Flubenol®)
- Buchten immer sauber und trocken halten
- Geleerte Abteile und alle Geräte, welche Kontakt zu den Schweinen hatten, vor Neubelegung gründlich reinigen

Kontinuierliche Bestossung

- 1. Entwurmung über 10 Tage nach Einstellen in die Mast (z.B. mit Flubenol®)
- 2. Entwurmung Mitte Mast um das Risiko einer Ansteckung jüngerer Tiere zu minimieren
- Zwischen den Buchten Stiefel und Geräte reinigen
- Geleerte Abteile und alle Geräte, welche Kontakt zu den Schweinen hatten, vor Neubelegung gründlich reinigen.

Freilandhaltung

- 1. Entwurmung über 10 Tage nach "Einstellen" (z.B. mit Flubenol®)
- Mindestens 2-3 mal pro Mastperiode entwurmen (jeweils über 10 Tage)
- Parzellenwechsel nach jedem Mastumgang ist unbedingt nötig, um den Infektionsdruck so gering wie möglich zu halten
- Wenn möglich keine Schweine von der alten auf die neue Parzelle überführen. Wenn doch, vorher entwurmen.
- Regelmässige Kotuntersuchung (vor und 10 Tage nach Vollendung der Entwurmung) ist sinnvoll. Die Kotuntersuchung führen wir in unserer Praxis selber durch.